

Modulação da dor e da hiperalgesia do trato urinário devido a condições algogênicas do sistema reprodutivo das mulheres

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Giamberardino e cols. avaliaram o efeito das condições algogênicas do sistema reprodutivo das mulheres na percepção de dor no trato urinário durante 5 anos em 69 mulheres férteis com cálculos no trato urinário superior através de um questionário ad-hoc. Os pesquisadores observaram que mulheres com dismenorreia tiveram mais cólicas renais do que mulheres sem afecções uterinas ($p < 0.001$) ou mesmo mulheres que apresentavam dismenorreia porém que haviam sido tratadas com estroprogesterona ($p < 0.05$). Os resultados evidenciaram aumento de dor/hiperalgesia no trato urinário em pacientes dismenorreicas na presença de dor ou mesmo em períodos assintomáticos. Esse aumento poderia ser proveniente da sensibilização de segmentos espinais de projeção comum das duas áreas viscerais (T10-L1). Referência: Neurosc. Lett. 2001 304(1-2):61-4

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/modulacao-da-dor-e-da-hiperalgesia-do-trato-urinario-devido-a-condicoes-algogenicas-do-sistema-reprodutivo-das-mulheres · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.