

Novos fatores de risco na neuralgia pós-herpética

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Pesquisadores da Universidade de Rochester (USA), associados a pesquisadores da Universidade de Bristol e do Laboratório SmithKline Beecham (Reino Unido), sob a liderança de Robert Dworkin, estudaram a ocorrência de neuralgia pós-herpética em 1778 pacientes portadores de herpes zoster durante projeto de avaliação da eficácia antiviral do famciclovir. O estudo revelou que a severidade da dor pós-herpética é significativamente maior quando a doença atinge pacientes idosos, do sexo feminino, e quando acompanhada de prodromo, fatores de risco anteriormente já relatados em literatura. Além disso, observaram que a severidade da dor está relacionada também à intensidade do eritema que ocorre na fase aguda da doença, além de ser mais severa quando dermatômeros não trigeminais são atingidos pela doença. Os achados são relevantes, pois acrescentam novos fatores a serem considerados pelos clínicos no esforço de reduzir a probabilidade de ocorrência de neuralgia pós-herpética pelo adequado controle da dor na fase aguda da doença.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/novos-fatores-de-risco-na-neuralgia-pos-herpetica · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.