

O uso de altas doses de opioides aumenta o risco de uso de heroína

pelos militares dos EUA Estudos já comprovaram que o uso excessivo de opioides pode ocasionar aumento significativo no transtorno do uso de opioides e mortes por overdose. O presente trabalho buscou evidenciar que a dose e a duração das pre

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

pelos militares dos EUA Estudos já comprovaram que o uso excessivo de opioides pode ocasionar aumento significativo no transtorno do uso de opioides e mortes por overdose. O presente trabalho buscou evidenciar que a dose e a duração das prescrições de opioides (receitadas para o tratamento da dor crônica) favorecem o uso subsequente de heroína por militares veteranos dos Estados Unidos. Um relatório do Department of Veterans' Affairs mostra que mais de um milhão de veteranos dos Estados Unidos recebem opioides e quase metade deles continua além de 3 meses. Assim, foi realizado um estudo de coorte com 3570 veteranos. A partir da análise das doses e tempo de prescrição de opioides foi observado que o recebimento prévio de opioides em altas doses aumenta o risco de uso subsequente de heroína. Observou-se também que há maior incidência relacionada a fatores de risco como: nível de escolaridade e renda. Referência: Banerjee G, Edelman EJ, Barry DT, Crystal S, Gordon KS, Gordon AJ, Gaither JR, Green TC, Kerns RD, Manhapra A, Moore BA, Fiellin DA, Marshall BDL. High-dose prescribed opioids are associated with increased risk of heroin use among United States military veterans. Pain. 2019; 160(9):2126-2135. Alerta submetido em 20/09/2019 e aceito em 20/09/2019.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/o-uso-de-altas-doses-de-opioides-aumenta-o-risco-de-uso-de-heroina · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE