

O uso de opioides no pré-operatório pode aumentar a chance de uso

prolongado após cirurgia? As cirurgias de coluna apresentam maior risco de uso prolongado de opioides no pré-operatório e pós-operatório, podendo acarretar problemas, como pior dor no sítio cirúrgico, maior tempo de internação e atraso no

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

prolongado após cirurgia?

As cirurgias de coluna apresentam maior risco de uso prolongado de opioides no pré-operatório e pós-operatório, podendo acarretar problemas, como pior dor no sítio cirúrgico, maior tempo de internação e atraso no retorno às atividades diárias. Esse estudo norte-americano utilizou dados do Programa de Monitoramento de Medicamentos Prescritos (PDMP) e registro estadual de alta hospitalar com objetivo de identificar a quantidade de cirurgias de artrodese e as prescrições de opioides,

abordando as questões como a quantificação de pacientes que utilizaram opioides a curto/longo prazo no pré e pós-operatório, quantos sofreram alterações no padrão de uso e qual perfil prediz o uso prolongado no pós-operatório. Definindo o período perioperatório, o uso em curto prazo, uso prolongado e episódico, a análise incluiu também outros fatores para avaliar o risco de uso persistente no pós-cirúrgico.

Os resultados sugerem que o uso prolongado de opioides ou benzodiazepínicos no pré-operatório e maiores doses nos 30 dias de pós-cirurgia aumentam o risco de uso prolongado no pós-operatório. Estes achados apontam a necessidade de

manejos diferentes para o controle da dor, uma vez que raramente a cirurgia de artrodese vai reduzir o uso destes medicamentos e que a sua exposição prévia é tão ou mais importante que o perfil do paciente. Estratégias não farmacológicas, uso de outros analgésicos, tratamento dos transtornos de humor podem ser eficazes para minimizar o uso de opioides e evitar os resultados adversos apontados.

Referências: Deyo, RA, Hallvik, SE, Hildebran, C, Marino, M, Okane, N, Carson, 1, Otterloo, JV, Otterloo, Wright, DA.,. Millet LM, Wakeland, W. Use of prescription opioids before and after an operation for chronic pain (lumbar fusion surgery). Pain. 2018, 159(6), 1147-1154.

Alerta submetido em 02/07/2018 e aceito em 02/07/2018.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/o-uso-de-opioides-no-pre-operatorio-pode-aumentar-a-chance-de-uso · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.