

Oxcarbazepina no controle da dor neuropática

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Fenitoína e carbamazepina são drogas antiepiléticas efetivas no tratamento da neuralgia do trigêmio. Estas drogas bloqueiam canais de sódio, reduzindo a hiperexcitabilidade de nervos lesados. E. Carrazana e I. Mikoshiba, de New Jersey (EUA) e Tóquio (Japão), respectivamente, apresentaram revisão a respeito da utilidade da oxcarbazepina, antiepilético de segunda geração, como medicação alternativa eficaz no tratamento da neuralgia do trigêmio. Esta droga, além de atuar bloqueando canais de sódio voltagem-dependentes, também modula canais de cálcio do tipo N. Comparada com suas antecessoras, a oxcarbazepina é melhor tolerada, induz rash cutâneo com menor frequência, tem baixa hepatotoxicidade e pouco efeito sobre o perfil hematológico. Além disso, estudos presentes na revisão indicam que a medicação é efetiva também no controle de outros tipos de dor neuropática, tais como a dor complexa regional e dor da neuropatia diabética. Referência: Journal of Pain and Symptom Management 25(55): S31-S35, 2003.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/oxcarbazepina-no-controle-da-dor-neuropatica · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.