

Perda da cardioproteção conferida pela aspirina após co-tratamento com ibuprofeno

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Um dos analgésicos mais prescritos mundialmente, o ibuprofeno, parece limitar os efeitos cardiovasculares benéficos conferidos pela aspirina. O estudo liderado por Tom MacDonald, do Ninewells Hospital and Medical School, em Dundee, e desenvolvido em Tayside, Reino Unido, envolveu mais de 7.000 pacientes que faziam uso diário de aspirina para prevenção de ataques cardíacos. Aqueles que faziam uso frequente de ibuprofeno mais aspirina tiveram significativo aumento da mortalidade por motivos desconhecidos ou por problemas cardiovasculares. Apesar dos resultados serem referentes a pacientes que fazem uso frequente de ibuprofeno, os pesquisadores acreditam que a interação acontece também agudamente, ou seja, após a ingestão de uma única dose de ibuprofeno, o que ofereceria risco em casos de prevenção de trombose venular em viagens aéreas. Alternativamente, os pesquisadores sugerem o uso de outros analgésicos, como o paracetamol.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/perda-da-cardioprotecao-conferida-pela-aspirina-apos-co-tratamento-com-ibuprofeno · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.