

Pesquisa revela principais indicações do uso de opioides no Reino Unido

Um estudo inédito realizado no Reino Unido analisou dados nacionais em larga escala para identificar as principais indicações do uso de opioides na atenção primária. O consumo desses medicamentos tem gerado preocupação nas últimas duas décadas

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Um estudo inédito realizado no Reino Unido analisou dados nacionais em larga escala para identificar as principais indicações do uso de opioides na atenção primária. O consumo desses medicamentos tem gerado preocupação nas últimas duas décadas, devido ao aumento de atendimentos médicos, hospitalizações e mortes associadas ao seu uso. O estudo revelou que a maioria das prescrições foi relacionada a condições do sistema musculoesquelético, seguidas por doenças respiratórias. Entre os procedimentos cirúrgicos, as cirurgias ortopédicas — como substituições de joelho e quadril — foram as mais associadas ao uso de opioides. O perfil predominante dos usuários era de mulheres brancas com mais de 55 anos. A análise incluiu dados de pacientes atendidos entre 2006 e 2021, excluindo aqueles com indicação oncológica e menores de 18 anos. Os opioides mais prescritos foram codeína (77,4%), hidrocodona (13,4%), tramadol (6,7%) e morfina (1,2%). As condições musculoesqueléticas representaram 31,6% das indicações, com destaque para osteoartrite (60%) e dor lombar (41%). Outras indicações relevantes incluíram infecções respiratórias (45%) e condições neurológicas (18%). Diante desses achados, o estudo destaca a necessidade de abordagens mais criteriosas na prescrição de opioides, considerando os riscos e

benefícios, especialmente em pacientes com múltiplas condições clínicas. Identificar os padrões de uso e as patologias mais associadas pode contribuir para estratégias de prevenção e redução de riscos a longo prazo. Referência: Ramirez Medina CR, Lyon M, Davies E, et al. Clinical indications associated with new opioid use for pain management in the United Kingdom: using national primary care data. Pain. Published online October 24, 2024. doi:10.1097/j.pain.0000000000003402 Escrito por Aline Frota Brito.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/pesquisa-revela-principais-indicacoes-do-uso-de-opioides-no-reino-unido · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE