

Pesquisadores americanos revisam o uso de Dexmedetomidina na prevenção de dores pós-anestesia

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Um artigo recentemente publicado revisa a importância do uso da Dexmedetomidina como cuidado adicional na prevenção de dores pós-anestesia refratárias aos tratamentos convencionais. O uso desse medicamento na analgesia e sedação profunda ganhou popularidade devido à sua marcante eficácia e segurança em relação a outros agentes conhecidos utilizados para esse fim, como, por exemplo, os opioides e os benzodiazepínicos. Entretanto, embora seus benefícios como terapia paliativa estejam sendo evidenciados, ainda são necessários mais estudos para determinar seu mecanismo de ação. Além disso, seu uso parece ser complicado pelo seu alto potencial de interagir com outras drogas e sua capacidade pronunciada de induzir efeitos colaterais. (LFF) Autores e procedência do estudo: Jackson KC, Wohlt P, Fine PG - University of Utah Health Sciences Center, USA; Referência: Dexmedetomidine: a novel analgesic with palliative medicine potential. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2006;20(2):23-7.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/pesquisadores-americanos-revisam-o-uso-de-dexmedetomidina-na-prevencao-de-dores-pos-anestesia · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.