

Pílula de maconha apresenta melhor efeito para alívio da dor

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Um estudo promissor publicado na revista *Neuropsychopharmacology*, demonstrou o potencial terapêutico dos canabinoides para tratar dor, principalmente quando administrado via oral, quando comparado ao efeito analgésico da maconha fumada. A pílula contém um ingrediente ativo da maconha - tetrahydrocannabinol (THC) - e já foi aprovado para o uso em pacientes que estão em tratamento de quimioterapia. O estudo envolveu 30 participantes, os quais foram convidados a fumar maconha, tomar via oral ou um placebo. Em seguida foram submetidos ao teste de cold pressor test, que consiste na imersão da mão em um banho de água fria (4 °C) por até dois minutos. Os resultados demonstraram que a maconha fumada e a pílula em comparação com o placebo baixaram as avaliações subjetivas de dor, reduziram a sensibilidade à dor e aumentaram a tolerância à dor. Os especialistas do estudo também constataram que a pílula propiciou um efeito analgésico mais duradouro e foi menos susceptível ao uso abusivo, em relação à maconha fumada. Além disso, o uso do comprimido de THC tornou a experiência de dor mais suportável, ao invés de diminuir a intensidade da dor. Um dos pontos relevantes da utilização da maconha como tratamento é a ocorrência de abstinência após sua utilização, que pode produzir uma síndrome caracterizada por humor negativo (por exemplo, irritabilidade, ansiedade, tristeza), dores musculares, calafrios e diminuição da ingestão de alimentos. Neste estudo foi observado que a administração oral do THC durante a abstinência de maconha diminuiu a ansiedade, os problemas para

dormir, calafrios e o desejo excessivo por maconha, e consequente redução na intoxicação. Os autores apontam que esse efeito observado foi apenas nas pessoas que já haviam fumado maconha diariamente pelo menos uma vez ao longo da vida. Portanto, os efeitos do comprimido em não-fumantes ainda não são conhecidos. Embora maiores avanços sejam necessários, os resultados mostram o potencial relevante para o uso médico da pílula THC. Referências: Sarah Glynn. Marijuana Pill May Be Better For Pain Relief. Article Date: 23 Apr 2013. <http://www.medicalnewstoday.com/articles/259482.php> Cooper ZD, Comer SD, Haney M. Comparison of the Analgesic Effects of Dronabinol and Smoked Marijuana in Daily Marijuana Smokers. Neuropsychopharmacology. 2013 doi: 10.1038/npp.2013.97. [Epub ahead of print]

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/pilula-de-maconha-apresenta-melhor-efeito-para-alivio-da-dor · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.