

Pontos-gatilhos miofasciais cervicais: inativação termoguiada

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Pesquisas demonstram a importância da termografia como ferramenta para identificar pontos-gatilhos miofasciais, orientar o bloqueio anestésico, e documentar o acometimento muscular, para uma possível intervenção. Paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, com dor em região cervical com irradiação dorsal há dois meses, exposto a tratamento, porém sem melhoras foi submetido a termografia por infravermelho, infiltração de pontos identificados com lidocaína sem vasoconstritor e agulhamento. A termografia no paciente facilitou e possibilitou documentar a eficácia do bloqueio anestésico com a inativação dos pontos-gatilhos e guiou o bloqueio de pontos latentes não relatados como dolorosos à palpação inicial, sendo uma ferramenta promissora para o tratamento dessa síndrome. Referência: R. P. S. Lima, M. L. Briosch. NeuroThermo Scan – Termografia Médica. USP. SIMBIDOR – Simpósio Brasileiro e Encontro Internacional Sobre Dor (11º, 2013; São Paulo) 11º SIMBIDOR: Arquivos 2013 - (editores) Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta, Geana Paula Kurita, Claudio Fernandes Corrêa - São Paulo - Esfera Editora - 2013.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/pontos-gatilhos-miofasciais-cervicais-inativacao-termoguiada · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.