

Prevalência de dor associada a lesões de combate em militares

Pesquisadores do Reino Unido realizaram uma revisão sistemática publicada em 2024 com objetivo de estabelecer a prevalência de dor neuropática crônica e pós- amputação em militares de forças nacionais após trauma de combate. A dor em membro

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Pesquisadores do Reino Unido realizaram uma revisão sistemática publicada em 2024 com objetivo de estabelecer a prevalência de dor neuropática crônica e pós-amputação em militares de forças nacionais após trauma de combate. A dor em membro fantasma e dor em membro residual foram mais prevalentes, em 57% e 61% da amostra em análise, respectivamente. Verificou-se também que a prevalência das dores pode ter relação com o tempo desde a lesão. O trauma de combate pode causar danos generalizados aos tecidos e perda de membros. Isso pode resultar em dor neuropática crônica e pós-amputação, incluindo dor de membro fantasma e dor de membro residual decorrentes de lesões dos nervos e perda de segmento anatômico. A amostra foi caracterizada por 14738 participantes de 6 forças armadas nacionais, contendo primariamente participantes do sexo masculino, com média de idade de 30 anos que vivenciaram as principais guerras ao redor do mundo, que ocorreram entre os anos de 1914 à 2015, onde se observaram prevalências pontuais, temporais e ao longo da vida. Sendo analisadas estatisticamente por meta análise, em métodos de variância inversa e qui- quadrado. Houve limitações relacionadas a amostra selecionada no estudo, a qual se restringiu a militares que estiveram ativos em combates e,

assim apresentando incógnitas a respeito do impacto das lesões e traumas para a sociedade civil, de maneira geral, bem como a não representatividade da repercussão da dor neuropática crônica e pós-amputação no aspecto holístico. Porém, com grandes contribuições para o desenvolvimento e seguimento de projetos já iniciados com foco na área militar. Referência: Kumar A, Soliman N, Gan Z, et al. A systematic review of the prevalence of postamputation and chronic neuropathic pain associated with combat injury in military personnel. Pain. 2024;165(4):727-740. doi:10.1097/j.pain.0000000000003094 Alerta submetido em 19/04/2024 e aceito em 12/08/2024. Escrito por Ana Luiza Martins Costa dos Santos e Roberto Junior Rodrigues de Jesus.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/prevalencia-de-dor-associada-a-lesoes-de-combate-em-militares · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE