

Protocolo de Dor PP é útil para a avaliação de dor pós-lesão medular

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

A lesão medular (LM) leva geralmente à paralisia de nervos sensitivos, ou seja, perda da sensibilidade na região inervada pelos nervos afetados. Infelizmente, essa paralisia não significa que o indivíduo está livre da dor. De fato, algumas pessoas com LM podem apresentar um tipo de dor crônica na área em que não possuem sensibilidade. Assim, é importante uma boa avaliação da dor, que pode ser obtida pelo uso de um bom protocolo de avaliação. O estudo apresentado por P.E. Dokladal, do Laboratório de Pesquisas de Injúrias à Medula Espinal, em Zurique, Suíça, avaliou 74 pacientes utilizando o protocolo PP, que consistia de duas partes: a) avaliação e diferenciação dos diferentes tipos de dor (por exemplo, musculoesqueléticas, neuropáticas e viscerais) e b) questionamento com relação ao estado geral de saúde, humor, ansiedade, qualidade do sono, e sequelas físicas em geral. Como resultado, o pesquisador concluiu que o PP é um instrumento bastante confiável para avaliação da dor e enfoca características comuns após a LM, sendo útil tanto para uso na clínica quanto na pesquisa. Veja mais detalhes no resumo original. Autores e procedência do trabalho: P.E. Dokladal - Spinal Cord Injury Research Lab, University Hospital Balgrist, Zurich, Switzerland; Título do estudo: Validity and reliability of a new pain protocol for subjects with a spinal cord injury in a european setting.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/protocolo-de-dor-pp-e-util-para-a-avaliacao-de-dor-pos-lesao-medular · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.