

Psilocibina para alívio de dor neuropática e musculoesquelética

crônicas Uma série de casos produzida nos EUA apontou que o uso de psilocibina em doses subalucinógenas pode minimizar a dor crônica. Os entrevistadores procuraram por pacientes com dor crônica neuropática e musculoesquelética que não apres

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

crônicas Uma série de casos produzida nos EUA apontou que o uso de psilocibina em doses subalucinógenas pode minimizar a dor crônica. Os entrevistadores procuraram por pacientes com dor crônica neuropática e musculoesquelética que não apresentaram boas respostas aos tratamentos receitados anteriormente. Foram analisados dados acerca da via de ingestão, duração do efeito, quantidade e possíveis efeitos colaterais. O estudo foi realizado com três pacientes e seus relatos de uso de psilocibina. Todos os pacientes apresentaram entre 80 a 100% de melhora em seu quadro de dor, tendo eficácia variando entre algumas horas (3-8), até semanas (2-4) com doses entre 250mg e 1000mg, sendo todos ingeridos via oral, com tratamento há pelo menos seis meses. Ao serem perguntados sobre efeitos adversos, todos os participantes negaram efeitos somáticos, cognitivos ou alucinógenos significativos. Dessa forma, psilocibina apresentou resultados favoráveis para dor crônica e abre portas para a possibilidade de pesquisas mais elaboradas. Entretanto, é válido ressaltar a falta de informações sobre os possíveis efeitos adversos a curto e longo prazo, bem como a quantidade e concentração seguras para consumo pela falta de estudos na área. Referências: Lyes M, Yang KH, Castellanos J, Furnish T. Microdosing psilocybin for chronic

pain: a case series. Pain. 2023;164(4):698-702.
doi:10.1097/j.pain.0000000000002778 Alerta submetido em 09/06/2023 e aceito
em 09/06/2023. Escrito por Mariana Jonas Smith.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/psilocibina-para-alivio-de-dor-neuropatica-e-musculoesqueletica · Conteúdo do Boletim DOL —
Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE