

Recém-nascidos sentem dor durante procedimentos médicos de rotina

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Muitos médicos duvidam que recém-nascidos apresentam capacidade fisiológica de sentir dor ou ainda não são seguros quanto à forma mais segura de tratar a dor em bebês tão jovens. Segundo uma declaração conjunta da Academia Americana de Pediatria e da Sociedade de Pediatria do Canadá, o fato dos neonatos serem submetidos a procedimentos dolorosos sem receberem alívio da dor está associado ao aumento da mortalidade e afeta a resposta da criança à dor no futuro. Um estudo publicado em fevereiro de 2000 na revista *Pediatrics* mostrou que mudanças na frequência cardíaca, respiratória e pressão sanguínea ocorrem quando o neonato sente dor. Os pesquisadores sugerem que medidas simples como a sacarose, sugar uma chupeta ou ser seguro pelos pais ajudam a diminuir a dor e devem ser adotadas durante a realização de procedimentos de rotina como o teste do pezinho.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/recem-nascidos-sentem-dor-durante-procedimentos-medicos-de-rotina · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.