

Relação entre o uso de analgésicos não narcóticos e o risco de hipertensão em mulheres americanas

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Dedier e cols, do Departamento de Medicina do Centro Médico de Boston, Massachussets, EUA, avaliaram a associação entre o uso da aspirina, acetaminofeno ou outros anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e hipertensão arterial em um grupo de 51.630 mulheres entre 44 e 69 anos que não apresentavam história de hipertensão e nem de insuficiência renal. Comparadas às não usuárias, mulheres que usaram aspirina ou acetaminofeno 1 dia por mês ou outros AINEs 5 dias por mês tiveram um significativo aumento no risco de desenvolvimento de hipertensão. Estes pesquisadores aconselham aos médicos que alertem seus pacientes sobre o risco do desenvolvimento de hipertensão arterial após o uso de analgésicos não narcóticos. Nota da redação 1: Vale também como orientação à população que corriqueiramente faz uso destes medicamentos sem orientação médica. Nota da redação 2: Apesar da importância do trabalho, um estudo retrospectivo não permite o estabelecimento de uma relação causal entre os parâmetros avaliados.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/relacao-entre-o-uso-de-analgescicos-nao-narcoticos-e-o-risco-de-hipertensao-em-mulheres-americanas · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.