

Relâmpagos e enxaquecas

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Um estudo conduzido por um grupo de pesquisadores no centro-oeste dos Estados Unidos sugere que os raios podem desencadear dores de cabeça em pessoas com enxaqueca. Esse fato não está relacionado a outros fatores meteorológicos. Participantes de Ohio e Missouri foram avaliados diariamente por um período de até 6 meses e relataram a presença ou a ausência de dor de cabeça, a intensidade da dor (em uma escala de 0 a 10) e os sintomas associados como náusea, vômito, fotofobia e fonofobia. Durante esse período de estudo, sensores detectaram sinais eletromagnéticos oriundos de raios a uma distância de até 500 metros. Todos os dados meteorológicos foram coletados diariamente. Esse estudo revela que há um aumento na probabilidade do aparecimento de dores de cabeça nos dias que há a presença de raios. No entanto, é desconhecido se os raios desencadeiam diretamente as dores de cabeça através das ondas eletromagnéticas ou indiretamente pela produção de aerossóis, indução de esporos de fungos ou outros mecanismos. Referência: Martin GV, Houle T, Nicholson R, Peterlin A, Martin VT. Lightning and its association with the frequency of headache in migraineurs: an observational cohort study. *Cephalalgia*. 2013 33(6):375-83.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/relampagos-e-enxaquecas · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.