

Revisão discute maneiras de impedir o desenvolvimento de infecções oportunistas em pacientes tratados com terapia anti-TNF

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Como já discutido em edições anteriores, as terapias anti-Fator de Necrose Tumoral (TNF), com o uso de medicamentos como infliximab, etanercept, e adalimumab, vêm sendo utilizadas de forma significativa no controle de doenças inflamatórias como a artrite. No entanto, o uso crônico destas drogas tem sido associado ao desenvolvimento de doenças infecciosas oportunistas, principalmente tuberculose e infecções fúngicas, uma vez que o TNF desempenha papel importante no sistema imunológico. Em um artigo recentemente publicado no periódico *Nature Clinical Practice Rheumatology*, Kevin Winthrop discute quais seriam os procedimentos necessários para se evitar esse tipo de efeito indesejável. Considerando, por exemplo, que nestes pacientes a tuberculose apresenta-se frequentemente em uma forma extrapulmonar ou como uma doença disseminada, o autor comenta que os clínicos devem estar atentos para qualquer sintoma passível de ser associado a esta doença, como febre, perda de peso ou tosse. Ainda, para prevenir a reativação de uma tuberculose em estado latente, os médicos deveriam fazer uma pesquisa prévia para tuberculose. Tal atitude preventiva tem diminuído a ocorrência de tuberculose em pacientes que estão sendo submetidos à terapia anti-TNF. Um ponto importante a ser considerado é que talvez esta pesquisa prévia pode também ser interessante para os outros tipos de doenças oportunistas associadas a este tratamento. Autores e procedência do estudo: KL Winthrop - Assistant Professor in the Division of

Infectious Diseases, Department of Medicine, and in the Department of Public Health and Preventive Medicine, Oregon Health and Science University, Portland, OR, USA. Referência: Risk and prevention of tuberculosis and other serious opportunistic infections associated with the inhibition of tumor necrosis factor. Nat Clin Pract Rheumatol. 2006 Nov;2(11):602-10.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/revisao-discute-maneiras-de-impedir-o-desenvolvimento-de-infeccoes-oportunistas-em-pacientes-tratados-com-terapia-anti-tnf · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE