

Revisão publicada por pesquisadores da Universidade de Londres e da Universidade de Valência aborda as manifestações adversas na região orofacial causadas pelo uso de medicamentos

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

C. Scully, do Eastman Dental Institute for Oral Health Care Sciences da Universidade de Londres, Inglaterra, e J.-V. Bagan, da Universidade de Valência, Espanha, revisaram uma série de drogas comumente utilizadas em tratamentos de distúrbios orofaciais e as relacionaram com manifestações adversas que acometem essa região. anti-inflamatórios (como o diclofenaco, o ácido acetilsalicílico, a indometacina e os corticoides), antidepressivos (como bloqueadores de recaptação de neurotransmissores), antibióticos (como a penicilina) e outras drogas que causam diversos tipos de reações como alteração no paladar, alteração da mucosa oral, neuropatias, dor e disestesia oral, halitose e alteração da coloração dental, foram abordadas separadamente, sendo que para cada uma dessas reações foram listadas drogas que poderiam estar envolvidas na gênese do problema. Além disso, os autores enfatizaram drogas que causam a xerostomia, distúrbio presente em 63% dos pacientes hospitalizados e queixa de todos os pacientes que usufruem de drogas durante tratamento psiquiátrico.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/revisao-publicada-por-pesquisadores-da-universidade-de-londres-e-da-universidade-de-valencia-aborda-as-manifestacoes-adversas-na-regiao-orofacial-causadas-pelo-uso-de-medicamentos · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.