

Síndrome de Dor Complexa Regional do tipo I (distrofia simpática reflexa) está relacionada com infecção prévia?

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Estudo desenvolvido por van de Vusse e cols., do Hospital Universitário da Universidade Maastricht (Holanda), encontrou soroprevalência de Parvovirus B19 altamente significativa (77%) em amostra de 52 pacientes portadores de Síndrome de Dor Complexa Regional do tipo I (SDCR-I). A prevalência foi maior para SDCR-I em membros inferiores (94%) do que em membros superiores (68%). A presença de anticorpos contra outros micrORGANISMOS neurotrópicos mais frequentes foi também investigada. Não foram encontrados portadores de anticorpos contra *T. pallidum*, *Borrelia burgdorferi* ou HTLV-1. Quatro pacientes foram positivos para *Campylobacter jejuni*. A soroprevalência não diferiu daquela encontrada no grupo controle para citomegalovirus, vírus Epstein-Barr, vírus herpes simplex e toxoplasma gondii. Todos os pacientes foram soropositivos para vírus varicella zoster, mas a prevalência de anticorpos para este vírus foi similar à da população normal. O estudo é entusiasmante, mas requer confirmação em outras áreas geográficas.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/sindrome-de-dor-complexa-regional-do-tipo-i-distrofia-simpatica-reflexa-esta-relacionada-com-infeccao-previa · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.