

Terapia anti-TNF aumenta risco de neutropenia

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

A terapia imunobiológica, principalmente com drogas anti-TNF, tem sido utilizada efetivamente em várias doenças inflamatórias e auto-imunes, incluindo artrite reumatoide, psoríase artropática e espondilite anquilosante. Apesar de terem revolucionado a terapia dessas doenças, o tratamento com os anticorpos contra TNF tem resultado no aparecimento de alguns efeitos adversos, entre eles o principal é o aumento na susceptibilidade à doenças infecciosas oportunistas, como tuberculose. Um trabalho retrospectivo examinou a possível correlação entre o tratamento com as terapias anti-TNF e um possível aparecimento de neutropenia nesses pacientes, o que poderia explicar em parte o aumento na susceptibilidade às doenças infecciosas. Foi verificado que 18% dos pacientes apresentaram pelo menos um episódio agudo de neutropenia depois do tratamento com anti-TNF, sendo que 6% desses pacientes apresentaram infecções secundárias à neutropenia. Estes resultados indicam que os pacientes sob tratamento com a terapia anti-TNF devem ser monitorados em relação ao aparecimento de neutropenia e às possíveis infecções secundárias associadas. Referência: Hastings R, Ding T, Butt S, Gadsby K, Zhang W, Moots RJ, Deighton C. Neutropenia in patients receiving anti-tumor necrosis factor therapy. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2010 Jun;62(6):764-9.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/terapia-anti-tnf-aumenta-risco-de-neutropenia · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.