

Tiagabina para o controle da dor neuropática

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Daniel Gruener, do Jefferson Medical College (Philadelphia, EUA), avaliou a eficácia da tiagabina, inibidor seletivo da recaptação de GABA, no tratamento da dor neuropática isolada ou associada à ansiedade. O estudo foi realizado em 6 pacientes, um deles com dor neuropática apenas e 5 com dor neuropática associada à ansiedade. O tratamento foi iniciado com tiagabina 2 mg ao deitar durante os 3-4 primeiros dias, associada a ansiolítico e/ou antidepressivo. A dose de tiagabina foi aumentada em 4 mg nos 3-4 dias seguintes e depois em 4 mg a cada 3-4 dias, até que a dose ideal fosse atingida. Dor foi avaliada por Escala Analógica Visual (VAS) antes e após 2-4 semanas de tratamento. Os autores concluem pela eficácia do tratamento (redução do VAS inicial = 9.1 para VAS final = 6.8), sem ocorrência de efeitos colaterais, para uma dose diária média de tiagabina de 12 mg (2 vezes ao dia). Referência: Abstracts - 10th World Congress of Pain® - Pannel: 598-P232

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/tiagabina-para-o-controle-da-dor-neuropatica · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.