

Toracotomia pode induzir dor crônica a partir de lesões de nervos locais

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Considerando que aproximadamente 50% dos pacientes submetidos à toracotomia desenvolvem dor crônica, pesquisadores dinamarqueses investigaram se esta dor teria origem neuropática, e analisaram a possível correlação entre a prevalência da dor crônica pós-toracotomia e a idade dos pacientes no momento da cirurgia. Pacientes submetidos ao procedimento durante a infância ou juventude foram investigados 20 a 40 anos após a cirurgia para quantificar e qualificar a presença de dor crônica. Apenas 2 dos 20 pacientes examinados relataram dor por mais de três anos após a toracotomia. Esses pacientes preencheram um questionário designado a identificar dores neuropáticas, o que revelou que esta dor provavelmente possui origem a partir de lesões de nervos. Além disso, os resultados também sugerem que a prevalência de dor crônica após toracotomia é menor quando a cirurgia é realizada na infância ou juventude. Em conclusão, os autores propõem que a dor crônica pós-toracotomia é, provavelmente, uma dor de origem neuropática. Autores e procedência do trabalho: A.D. Kristensen¹, T.A. Pedersen², V.E. Hjortdal², K. Emmertsen², L. Nikolajsen³ - Danish Pain Research Center, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark; ²Cardiothoracic and Vascular Surgery, Aarhus University Hospital, Skejby Sygehus, Aarhus, Denmark; ³Department of Anaesthesiology, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark; Título do estudo: Chronic pain following thoracotomy.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/toracotomia-pode-induzir-dor-cronica-a-partir-de-lesoes-de-nervos-locais · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.