

Uma análise de padrões e variações entre pacientes em terapia com uso

de opioides a longo prazo Descontinuações frequentes e reduções rápidas na dosagem ocorrem principalmente em pacientes com dosagens diárias acima de 50 Miligramas de Morfina Equivalente (MME). A prescrição apresenta uma grande diversidade e

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

de opioides a longo prazo Descontinuações frequentes e reduções rápidas na dosagem ocorrem principalmente em pacientes com dosagens diárias acima de 50 Miligramas de Morfina Equivalente (MME). A prescrição apresenta uma grande diversidade e as

doses prescritas variam ao longo do tempo. Os achados do estudo indicam altas taxas de descontinuação e rápida redução gradual nesta população, particularmente entre aqueles prescritos diariamente, dosagens >50 MME e uma menor redução nas trajetórias de dosagens individuais em doses ≥ 150 MME. Esta análise de agrupamento caracteriza padrões únicos jamais vistos, informando estudos futuros sobre padrões de prescrição de opioides com maior compreensão e destacando a necessidade de uma intervenção cautelosa e centrada no paciente ao ajustar a dosagem de opioides, considerando benefícios, riscos e devidas intervenções clínicas para melhorar a segurança e eficácia do tratamento. Ainda é necessário pesquisas adicionais com mais informações a partir de bancos de dados e padrões em indivíduos em uso da terapia. Dessa forma, o objetivo deste estudo é identificar e caracterizar padrões e variações na dosagem diária de opioides entre pacientes recém-iniciados em terapia de longo prazo. O estudo,

escrito e preparado por funcionários do Governo Federal, analisou dados do banco de dados de 2018 a 2019, abrangendo 92% das prescrições de farmácias nos EUA. Foram calculados os Miligramas de Morfina Equivalente (MME) para determinar a dosagem diária total de opioides dos pacientes. Os pacientes foram estratificados em quatro categorias (<50, 50-89, 90-149 e ≥ 150 MME) com base na dosagem média diária, largura média da silhueta e dados demográficos durante o período inicial para identificar padrões a partir do período de referência e de acompanhamento (270 dias). Referência: Rikard, S. M., Nataraj, N., Zhang, K., Strahan, A. E., Mikosz, C. A., & Guy, G. P., Jr (2023). Longitudinal dose patterns among patients newly initiated on long-term opioid therapy in the United States, 2018 to 2019: an observational cohort study and time-series cluster analysis. *Pain*, 164(12), 2675-2683. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002994> Escrito por Maria Eduarda Gonçalves dos Santos.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/uma-analise-de-padroes-e-variacao-entre-pacientes-em-terapia-com-uso · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.