

Uso combinado de antiinflamatórios aumenta o risco de sangramento gástrico em idosos - estudo canadense alerta para os perigos dessa prática comumente utilizada

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Um estudo publicado na edição de abril do periódico *American Journal of Gastroenterology* mostra que a combinação bastante utilizada de drogas antiinflamatórias não-esteroidais (AINEs) do tipo da aspirina e acetaminofeno (paracetamol) apresenta maior risco de causar sangramento gastrointestinal (GI) em pacientes de idade avançada quando comparada ao uso dos agentes isolados. Segundo os autores da matéria, o uso concomitante de inibidores da bomba de prótons (antiácidos) com AINEs pode reduzir esse risco de efeitos adversos, embora seu efeito no trato GI baixo ainda não esteja completamente claro. O estudo comparou as taxas de hospitalização devido ao aparecimento de úlceras, perfurações ou sangramentos gastrintestinais em pacientes que faziam uso de AINEs ou de AINEs + acetaminofeno com ou sem o uso dos medicamentos antiácidos e também o uso isolado de acetaminofeno. O grupo incluiu pacientes com 65 anos ou mais que foram medicados com as drogas no período entre janeiro de 1998 a dezembro de 2004. Os dados observados são preocupantes, não somente pelo fato de que a combinação dos medicamentos é uma prática comum, mas por mostrarem que essa combinação de AINEs e acetaminofeno aumenta o risco de complicações em quase 3 vezes. Mais estudos do mesmo tipo devem ser realizados e divulgados, principalmente para alertar os profissionais de saúde que muitas vezes a possibilidade de melhora no efeito dos

medicamentos combinados pode ser acompanhada da possibilidade de causar graves problemas colaterais. Referência do artigo original: Rahme E, Barkun A, Nedjar H, Gaugris S, Watson D. Hospitalizations for upper and lower GI events associated with traditional NSAIDs and acetaminophen among the elderly in Quebec, Canada. Am J Gastroenterol. 2008 Apr;103(4):872-82. Epub 2008 Mar 26.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/uso-combinado-de-antiinflamatorios-aumenta-o-risco-de-sangramento-gastrico-em-idosos-estudo-canadense-alerta-para-os-perigos-dessa-pratica-comumente-utilizada · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE