

Uso de analgésicos comuns pode ser relacionado ao aumento de risco de desenvolvimento de hipertensão

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Os analgésicos não-narcóticos (corticoides ou do tipo da aspirina ou dipirona) são os medicamentos mais utilizados para o tratamento e controle da dor. Um grupo de pesquisadores americanos analisou o uso destes medicamentos em mais de 16 mil homens sadios e o associou ao risco de desenvolvimento de hipertensão (pressão alta). No estudo foram verificados os medicamentos acetaminofeno (paracetamol), aspirina e outros anti-inflamatórios não-esteroidais. Segundo os dados colhidos, a frequência de uso dos analgésicos estudados pode ser associada a um moderado aumento no risco de hipertensão. Mais ainda, os autores sugerem, de um ponto de vista de saúde pública, que estes agentes devem ser usados com extrema cautela, visto que são os medicamentos mais prescritos e utilizados. Autores e procedência do estudo: John P. Forman, MSc, MD; Eric B. Rimm, ScD; Gary C. Curhan, MD, ScD - Channing Laboratory, Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School (Drs Forman, Rimm, and Curhan); Renal Division, Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital (Drs Forman and Curhan); and Departments of Epidemiology (Drs Forman, Rimm, and Curhan) and Nutrition (Dr Rimm), Harvard School of Public Health, Boston, Mass; Referência: Frequency of Analgesic Use and Risk of Hypertension Among Men. Arch Intern Med. 2007;167:394-399.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/uso-de-analgescicos-comuns-pode-ser-relacionado-ao-aumento-de-risco-de-desenvolvimento-de-hipertensao · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.