

Uso regular de antiinflamatório não-esteroidal pode estar associado à disfunção erétil

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

A disfunção erétil pode ser desencadeada por diversos fatores, dentre eles, intervenções cirúrgicas (principalmente na região ao redor do órgão sexual), problemas vasculares, doenças nervosas, diabetes, problemas hormonais e o uso de alguns medicamentos. Pesquisadores realizaram um estudo de corte prospectivo onde o uso regular de anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) apresentou correlação com o aumento da incidência de episódios de disfunção erétil. Este estudo abarcou 80.966 homens de diversos grupos étnicos, com idades entre 45 e 69 anos, todos os membros de um determinado plano de saúde. Dentre estes, 47,4% fazem uso regular de AINES e 29,3% relataram disfunção erétil moderada ou severa. O uso de AINES foi avaliado através de dados da farmácia e do relato do paciente. A disfunção erétil foi avaliada através de questionário. Os resultados deste estudo apontaram que o fator idade parece aumentar o uso regular de AINES. Por exemplo, 34,5% de homens com idade entre 45 e 49 anos utilizam regularmente AINES e 54,7% de homens entre 60 a 69 anos também. Este aumento se correlaciona com o aumento da incidência de episódios de disfunção erétil, por exemplo, de 13% para 42% nestas faixas etárias. Após o ajuste dos dados por idade, raça, fumo, diabetes mellitus, hipertensão, hiperlipidemia, doença vascular periférica, doença da artéria coronária e elevado índice de massa corporal, a correlação positiva permaneceu a mesma. Mais estudos são necessários para demonstrar positivamente esta

relação. Além disso, vale lembrar que na avaliação dos estudos de corte, é crítico observar a existência de vieses de seleção e informação, a continuidade do seguimento dos sujeitos de pesquisa, o controle dos fatores de confusão, a importância dos resultados e sua aplicabilidade na prática clínica. Referência: Gleason JM, Slezak JM, Jung H, Reynolds K, Van den Eeden SK, Haque R, Quinn VP, Loo RK, Jacobsen SJ. Regular nonsteroidal anti-inflammatory drug use and erectile dysfunction. J Urol. 2011 185(4):1388-93.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/uso-regular-de-antiinflamatorio-nao-esteroidal-pode-estar-associado-a-disfuncao-eretil · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE