

## Validação de métodos para avaliar a euforia induzida por opioide em

*adolescentes A euforia que ocorre na primeira exposição aos opiáceos é precursora do transtorno relacionado ao uso de opioides, na qual os adolescentes tem maior risco. Já existem medidas válidas para avaliar a euforia em estudos de risco*

---

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

---

adolescentes

A euforia que ocorre na primeira exposição aos opiáceos é precursora do transtorno relacionado ao uso de opioides, na qual os adolescentes tem maior risco.

Já existem medidas válidas para avaliar a euforia em estudos de risco de abuso de drogas, sendo estas o Questionário de Efeitos de Drogas e as escalas Morphine Benzedrine Group (MBG) e Lysergic Acid Diethylamide (LSD) do Inventário do Centro de Recursos de Vícios. Porém, estas não são usadas clinicamente para avaliar a resposta aos opioides e não foram validadas com adolescentes, sendo este o objetivo do estudo.

Foi testada a compreensão de 29 adolescentes das 3 medidas válidas, na qual todos conseguiram entender o Questionário de Efeitos de Drogas, 2 adolescentes não entenderam 14 das 16 perguntas presentes na escala de MBG e 1 adolescente não entendeu 8 das 14 perguntas presente na escala de LSD.

A partir disto, os pesquisadores irão realizar outras etapas para validação de método de avaliação de euforia induzida por opióides em adolescentes nos EUA, sendo uma destas as mudanças nas escalas (MBG e LSD) presente no Inventário

do Centro de Recursos de Vícios para melhor compreensão. O presente estudo espera em longo prazo mudar o paradigma de prescrição de opiáceos para adolescentes nos EUA e prevenir o transtorno relacionado ao uso de opioides.

Referências: Manworren 1, Manworren R. Validation of Measures of Opioid Induced Euphoria in Teenagers. 17º Congresso Mundial sobre Dor da Associação Internacional para o Estudo da Dor, Boston, Estados Unidos, 12-16 de Setembro de 2018.

Alerta submetido em 04/12/2018 e aceito em 04/12/2018.

4, Utilização de questionários preenchidos por pacientes com dor crônica O presente estudo propôs classificações da dor crônica com base nos fatores psicossociais, visto que estes influenciam no estado da doença e a torna mais complicada. Além disso, investigaram a relação das classificações por médicos com questionários preenchidos pelos pacientes.

Foram incluídos 1000 pacientes com dor crônica no estudo, na qual foi confirmado que 461 destes necessitam de intervenções psicossociais. Os seguintes questionários foram selecionados como preditivo efetivos dos fatores psicossociais: Escala Numérica da Dor, Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, Escala de Catastrofização da Dor, Questionário de Auto Eficácia da dor e a Escala de Funcionalidade Geriátrica.

Por meio dos questionários conseguiu identificar pacientes com muitos fatores psicossociais e estes influenciam diretamente no estado da dor crônica. O grupo de pesquisa destaca a possibilidade de desenvolver um sistema de diagnóstico usando um questionário simples e que no futuro este possa ser incluindo na entrevista médica.

Referências: Aono S, Owari K, Inoue S, Arai Y, Nishihara M, Ushida T. Prediction of Chronic Pain Classification Using Self-Completed Questionnaires. 17º Congresso Mundial sobre Dor da Associação Internacional para o Estudo da Dor, Boston, Estados Unidos, 12-16 de Setembro de 2018.

Alerta submetido em 04/12/2018 e aceito em 04/12/2018.

---

Fonte: [novo.dol.inf.br/materia/validacao-de-metodos-para-avaliar-a-euforia-induzida-por-opioide-em](http://novo.dol.inf.br/materia/validacao-de-metodos-para-avaliar-a-euforia-induzida-por-opioide-em) · Conteúdo do Boletim DOL  
— Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL · DOR ON LINE