

Variações no limiar de dor entre mulheres com ciclo menstrual normal ou que fazem uso de contraceptivos orais e em homens

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

O objetivo deste estudo foi avaliar se o limiar de dor aos testes de pressão (PPT) é influenciado pelas alterações hormonais durante o ciclo menstrual. O limiar de dor foi aferido por meio de teste algesimétrico eletrônico de pressão aplicada nos músculos mastigatórios (masséter e temporal) e no polegar de pacientes. Foram avaliadas 20 mulheres sendo que 10 utilizaram contraceptivos orais, durante 10 ciclos menstruais consecutivos nas 3 diferentes fases do ciclo menstrual (folicular, luteal e perimenstrual). O mesmo teste foi realizado em 10 homens seguindo o mesmo padrão durante o período de 1 ano. O PPT dos músculos avaliados foi significativamente menor durante as fases perimenstruais dos dois grupos de mulheres estudadas.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/variacoes-no-limiar-de-dor-entre-mulheres-com-ciclo-menstrual-normal-ou-que-fazem-uso-de-contraceptivos-orais-e-em-homens · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.