

Visão crítica do uso de rofecoxib para tratar artrite reumatóide

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

O rofecoxib foi recentemente aprovado para tratamento dos sintomas da artrite reumatoide. Uma avaliação clínica comparativa em mais de 8000 pacientes mostrou que esse fármaco não é mais efetivo que anti-inflamatórios convencionais (AINEs). Além disso, a frequência de efeitos adversos também não diferiu. O rofecoxib causou menos distúrbios gastrointestinais que o naproxen, porém mais que o placebo. O risco renal do rofecoxib foi semelhante ao dos outros AINEs. Possíveis efeitos cardiovasculares também não podem ser descartados. Nos EUA, vários óbitos decorrentes de complicações gastrointestinais associadas ao rofecoxib foram relatados. Dessa forma, a escolha do medicamento para tratamento sintomático da artrite reumatoide deve ser cuidadosa, apesar de todo marketing sobre a eficácia dos coxibs. Referência: Prescrire Int. 2003 Jun;12(65):89-90

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/visao-critica-do-uso-de-rofecoxib-para-tratar-artrite-reumatoide · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.